









INSTRUCTIONS AVANT LES INJECTABLES


EN PRÉPARATION À VOTRE TRAITEMENT D'INJECTIONS :

- Évitez l'alcool dans les 48 heures avant votre traitement 
- Évitez les antiplaquettaires ou les anti-inflammatoires (Aspirine, Plavix, etc.) dans les 5 jours avant vos injections 
- Évitez les produits naturels (ail, gingko biloba, etc.) dans les 5 jours avant votre injection 
- Évitez de vous maquiller la journée de vos injections 

CONTRE-INDICATIONS :



-  Grossesse ou allaitement
-  Allergie à l'acide hyaluronique
-  Maladie de peau active ou infection de peau
-  Utilisation d'anticoagulants (Eliquis, Xarelto, Coumadin, etc.)

FAITES ATTENTION SI :

- Vous avez un historique de cicatrices hypertrophiques ou de kéloïdes. Mentionnez-le à votre injecteur pour qu'il évite les techniques plus agressives nécessitant des incisions cutanées.
- Vous avez un historique de feux sauvages. Pour les injections de lèvres, votre médecin vous prescrira des médicaments pour éviter la réactivation du virus avec les injections. 

INSTRUCTIONS APRÈS LES INJECTABLES






IMMÉDIATEMENT :

- Des réactions telles que des rougeurs, des ecchymoses et de l'enflure temporaire peuvent se produire.
- Il est recommandé d'appliquer de la glace 15 minutes par heure aux endroits traités. 
- Évitez de toucher, masser ou gratter la région injectée. Gardez la tête élevée pour les 4 heures suivant l'intervention. 
- Évitez les activités physiques, le bronzage et la consommation d'alcool


POUR LES 12 PREMIERES HEURES

- Évitez de maquiller la région injectée 

POUR LES 24 PREMIERES HEURES





- Ne pratiquez pas d'activité physique 
- Ne consommez pas de boissons alcoolisées 
- Ne vous exposez pas au soleil, À la chaleur ou au froid extrême 
- Faites attention de ne pas plisser vos lèvres après remplissage (paille, bisou, cigarettes, etc.) 
- Si une douleur se fait soudainement ressentir ou si la peau blanchit aux sites d'injections, contactez immédiatement la clinique ou rendez-vous à l'urgence la plus près. 

POUR LES 2 SEMAINES SUIVANTES





- Évitez les température extrêmement chaudes ou froides, (sauna, bains chauds, etc.). et l'exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV. 

INSTRUCTIONS BEFORE INJECTIONS


IN PREPARATION FOR YOUR INJECTION TREATMENT :

- Avoid alcohol within 48 hours before your treatment 
- Avoid antiplatelets or anti-inflammatories (Aspirin, Plavix, etc.) within 5 days before your injections 
- Avoid natural products (garlic, ginkgo biloba, etc.) within 5 days before your injection 
- Avoid wearing makeup the day of your injections 

CONTRAINDICATIONS:


-  Pregnancy or breastfeeding
-  Allergy to hyaluronic acid
-  Active skin disease or skin infection
-  Use of blood thinners (Eliquis, Xarelto, Coumadin, etc.)

PAY ATTENTION IF :


- You have a history of hypertrophic scars or keloids. Mention this to your injector so that he avoids more aggressive techniques requiring skin incisions.
- You have a history of cold sores. For lip injections, your doctor will prescribe medication to prevent reactivation of the virus with the injections. 

INSTRUCTIONS AFTER INJECTIONS








IMMEDIATELY :

- Reactions such as redness, bruising and temporary swelling may occur.
- It is recommended to apply the ice 15 minutes per hour to the treated areas. 
- Avoid touching, massaging or scratching the injected area. Keep your head up for 4 hours after the procedure.

FOR THE FIRST 12 HOURS

- Avoid putting make-up on injected regions 

FOR THE FIRST 24 HOURS

- Avoid physical activities, sun tanning and consuming alcohol   
- Avoid lip actions such as kissing, suctioning on a straw and smoking   
- If you feel sudden pain or if you observe blanching of the skin, immediately contact the clinic or consult your nearest emergency hospital 

FOR THE FIRST 2 WEEKS

- Avoid settings with extreme heat or cold (sauna, hot baths, extended sun tanning period) 